

表2 毛豆新品種高雄8號與對照品種高雄2號之單

| 品 種名稱         | 單株一粒莢 |        | 單株二粒莢 |        | 單株  |
|---------------|-------|--------|-------|--------|-----|
| 名 稱           | 莢 數   | 莢 重(g) | 莢 數   | 莢 重(g) | 莢 數 |
| 89年冬作高屏三個地區平均 |       |        |       |        |     |
| 高雄8號          | 6.9   | 10.9   | 9.2   | 27.6   | 2.5 |
| 高雄2號          | 7.7   | 11.2   | 8.1   | 24.3   | 1.8 |
| LSD 5%        | 1.2   | 1.8    | 1.5   | 4      | 0.7 |
| 90年冬作高屏三個地區平均 |       |        |       |        |     |
| 高雄8號          | 7.9   | 11.7   | 7.9   | 23.2   | 2.6 |
| 高雄2號          | 7.1   | 10.2   | 7.4   | 20.6   | 2.3 |
| LSD 5%        | 0.9   | 1.1    | 0.9   | 2.9    | 0.5 |
| 兩年冬作高屏三個地區平均  |       |        |       |        |     |
| 高雄8號          | 7.4   | 11.3   | 8.6   | 25.4   | 2.6 |
| 高雄2號          | 7.4   | 10.7   | 7.8   | 22.5   | 2.1 |
| LSD 5%        | 0.7   | 1.1    | 0.8   | 2.3    | 0.4 |

呈株莢果特性

| 三粒莢   | 單株夾數 | 單株夾數(g) |
|-------|------|---------|
| 莢重(g) |      |         |
|       |      |         |
| 10.1  | 18.6 | 48.6    |
| 7.7   | 18.2 | 43.2    |
| 4.5   | 2.4  | 4.6     |
|       |      |         |
| 10.3  | 18.4 | 45.2    |
| 8.4   | 16.8 | 39.2    |
| 1.9   | 2.1  | 5.4     |
|       |      |         |
| 10.2  | 18.5 | 46.9    |
| 8.1   | 16.3 | 41.3    |
| 1.7   | 1.7  | 3.4     |