

110 年 6 月 主要農作物生產預測



殷瑞妤¹ 劉彥彤¹ 李芳琳¹ 謝廉一¹

果品類

香蕉收穫面積 1 萬 5,251 公頃，總產量 36 萬 1,987 公噸，較常年增產 3%；春夏蕉產量 19 萬 4,496 公噸，較 109 年減產 3%。

香蕉為周年性果樹，主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大宗主產區，依採收季節可分為春夏蕉（2 月下旬～9 月中旬採收）及秋冬蕉（9 月下旬～2 月上旬採收）。據各產區觀測結果，本年香蕉面積受檳榔廢園轉作影響略有增加，另受年初低溫、乾旱影響，部分地區有葉片黃化及產期延後情形，相較於近 5 年有豪雨、颱風等災害影響，110 年整體產量相對略有增加，春夏蕉產量亦評估因產期延後至秋冬蕉而略有減少。110 年預估收穫面積 1 萬 5,251 公頃，較 109 年 1 萬 4,968 公頃增加 2%，較常年平均略減 1%；產量 36 萬 1,987 公噸，較 109 年 35 萬 9,600 公噸增產 1%，較常年平均 35 萬 1,628

公噸，則增產 3%。另本年春夏蕉預估收穫面積為 7,731 公頃，較 109 年 7,874 公頃略減 2%；產量 19 萬 4,496 公噸，較 109 年 20 萬 1,243 公噸，則減產 3%。

番石榴收穫面積 7,753 公頃，總產量 20 萬 1,345 公噸，較常年增產 14%；上半年果產量 9 萬 5,803 公噸，較 109 年減產 2%。

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1～6 月）及下半年果（7～12 月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開 6～9 月水果盛產期及颱風豪雨季節。近 5 年間番石榴



註 1：政院農業委員會農糧署。

產量受 105 年風災及 107、108 年豪雨及水災影響，產量略有減少。109 年～本年初氣候平穩，生長狀況良好，惟因雨水持續不足，部分地區受可灌溉水源不足影響果實生長，致上半年產量略微下降，預估 110 年收穫面積 7,753 公頃，較 109 年 7,596 公頃增加 2%，較常年 7,337 公頃增加 6%；產量 20 萬 1,345 公噸，較 109 年 19 萬 8,054 公噸增產 2%，較常年 17 萬 6,108 公噸，則增產 14%。上半年果預估收穫面積 7,753 公頃，較 109 年 7,596 公頃略增 2%；產量 9 萬 5,803 公噸，較 109 年 9 萬 7,858 公噸，則略減 2%。

鳳梨收穫面積 7,819 公頃，產量 40 萬 7,822 公噸，較常年減產 5%。

鳳梨栽培品種以台農 17 號（金鑽）為大宗，主產期為 3～6 月，其餘尚有開英種（土鳳梨）產期 5～8 月、台農 20 號（牛奶鳳梨）產期 8～10 月、台農 16 號（甜蜜蜜）產期 4～7 月及台農 23 號（芒果鳳梨）產期 8～10 月等品種。主產區分布於屏東、嘉義、臺南、高雄及南投等縣市。鳳梨自定植至採收約需 18 個月，自然狀態下產期集中於 6～8 月，然因夏季高溫多雨易使肉聲果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求及配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於 8～10 月進行

催花處理生產春果，或於 3～4 月催花生產秋果，行政院農業委員會農糧署也持續推廣不同產期鳳梨品種，調節鳳梨市場供貨時間。本年部分產區年初略受寒流影響，或受乾旱影響，有延遲發育、果實較小等情形，整體平均產量較去年略減。110 年預估收穫面積 7,819 公頃，較 109 年 7,877 公頃略減 1%，較常年

平均 8,181 公頃減少 4%；產量 40 萬 7,822 公噸，較 109 年 41 萬 9,028 公噸減少 3%，較常年 42 萬 7,399 公噸，則減產 5%。



本地種芒果收穫面積 2,486 公頃，產量 1 萬 5,925 公噸，較常年減產 11%。

本地種芒果俗稱土檬果、柴檨、土檨仔，主產區分布於屏東、臺南及高雄等縣市，以屏東縣收穫面積最多，主要產期為 3～5 月。本地種芒果果實不大，惟酸甜風味十足且香氣濃郁，深受消費者喜愛，其幼果可供製作情人果，成熟果可製作蜜餞、芒果干、冰沙及芒果汁等。近年因部分田區轉作改良種芒果，面積逐漸減少，本年臺南、屏東產區開花情形良好，惟受缺水影響，各產區果粒偏小，又高屏部分產區受蟲害影響，略

有花蕊乾枯、著果量減少情形。預估110年收穫面積2,486公頃，較109年2,500公頃略減1%，較常年2,607公頃減少5%；產量1萬5,925公噸，較109年1萬7,633公噸減產10%，較常年1萬7,850公噸，則減產11%。

改良種芒果收穫面積1萬3,656公頃，產量17萬4,539公噸，較常年增產28%。

改良種芒果係指本地種以外之品種，栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區分布於臺南、屏東及高雄等縣市，其中又以臺南市收穫面積最多，約占全臺改良種芒果50%。各地產期略有差異，屏東地區主要產期為5～6月，臺南地區約為6月中旬～8月，透過栽植不同品種或產期調節，可提早或延後產期，使4～10月皆有芒果可供應市場。本年各產區芒果開花良好，雖受乾旱缺水致果粒偏小，但臺南產區因結果量多，相較於105、107、109年開花情形不佳，整體產量增加，屏東產區則受蟲害影響，產量略較109年減少1～1.5成，且評估產期略有延後。預估110年收穫面積1萬3,656公頃，較109年1萬3,561公頃略增1%，較常年1萬3,326公頃增加2%；產量17萬4,539公噸，較109



年15萬3,905公噸增產13%，較常年13萬6,814公噸，則增產28%。

荔枝收穫面積9,662公頃，產量5萬7,738公噸，較常年減產2%。

荔枝為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以黑葉為最多，其次為早熟種玉荷包，另有部分栽培地方品種或新育成品種。主產區分布於高雄、臺中、南投及臺南等縣市，並以高雄收穫面積最多，主要產期為5～8月。近5年間受颱風、旱災、低溫不足等原因，平均產量相對較低，尤以105年寒流及108年1～2月旱災及冬季低溫不足等影響最大。本年各主產縣市開花良好，惟受雨水不足影響，及依個別果園灌溉設備、土壤、坡度、栽培管理等因素，各果園產量差異大，整體平均有果粒偏小或落果情形，並以中部產區較為明顯。預估110年收穫面積9,662公頃，較109年9,715公頃略減1%，較常年9,860公頃減少2%；產量5萬7,738公噸，較109年7萬1,224公噸減少19%，較常年5萬9,199公噸，則減產2%。



龍眼收穫面積1萬461公頃，產量6萬35公噸，較常年減產11%。

龍眼為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以粉殼種為主。主產區分布於臺南、臺中、高雄、南投及嘉義等縣市，產期集中於7~9月，可利用分區種植不同產期品種實施產期調節。龍眼適應性廣，栽培管理方式通常較其他經濟果樹粗放，果實除可鮮食外，亦可烘培做龍眼乾及製成其他加工產品，分散市場。近年因受人口老齡化、荔枝椿象防治等影響，部分產區有轉作及廢園情形，致種植面積逐漸下降，本年開花情形良好，惟受缺水影響，部分產區有葉片萎凋、生長延遲、著果率不良或果實較小等情形，尤以山區較為嚴重，評估整體單位產量較常年減少，但仍需觀察6~7月降雨情形後，產量較為明朗。預估110年收穫面積1萬461公頃，較109年減少1%，較常年減少4%；產量為6萬35公噸，較109年產量6萬4,543公噸減產7%，較常年產量6萬7,338公噸，則減產11%。

文旦柚收穫面積4,021公頃，產量7萬3,950公噸，較常年減產1%。

文旦柚為柑桔類果樹，主產區分布於臺南、花蓮、新北及苗栗等縣市。果實成熟期一般於農曆節氣「白露」前後，依農民留花（果）時間及

種植地區不同而異，為中秋節應景果品。本年雖因部分產區達可採收株齡之面積增加，致較上年收穫面積略增，但相較於近年來部分果園因農民老化無力管理及廢園，收穫面積仍略較常年減少。受乾旱影響，有部分產區反映有落果情形，惟目前各產區正值生理落果期至小果期，實際落果情形、果實大小及產量，仍待持續觀察。預估110年收穫面積4,021公頃，較109年3,999公頃略增1%，較常年4,077公頃略減1%；產量7萬3,950公噸，較109年7萬3,445公噸增產1%，較常年7萬4,549公噸，則減產1%。

紅龍果收穫面積2,783公頃，產量6萬8,694公噸，較常年增產2%。

紅龍果為多年生草本植物，主產區分布於彰化、南投、屏東及臺南等縣市，主要產期為6~10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。前幾年因紅龍果價格佳，農民陸續由休耕田區或其他果樹改種，種植面積逐年大幅成長。惟近3年市場價格逐漸平緩，種植面積成長幅度亦隨之趨緩。本年受雨水不足略有影響開花情形或果重降低，但因紅龍果可多批次開花結果，不致影響全年產量。預估110年收穫面積2,783公頃，較上年

2,820公頃略減1%，與常年2,773公頃相當；產量6萬8,694公噸，較上年7萬1,211公噸減產4%，較常年6萬7,622公噸，則增產2%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積503公頃，產量3萬163公噸，較上月增產7%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月為高冷地產區一期作甘藍採收期，以宜蘭產區為大宗；彰化及雲林等平地產區則因氣候漸熱，收穫面積和產量減少。彰化及雲林產區本年一期作種植面積略減，且南投高山產區因乾旱缺水，部分田區有延後種植情形，致收穫面積及產量較109年同期減少。預估本月收穫面積503公頃，較上月464公頃增加9%；產量為3萬163公噸，較上月產量2萬8,226公噸，增產7%，與109年同期產量3萬4,549公噸比較，則減產13%。



結球白菜收穫面積61公頃，產量2,795公噸，較上月減產33%。

結球白菜喜冷涼氣候，本月氣候漸熱，較不適合結球白菜生育，主要以耐熱品種為主。主要產區為雲林及彰化，近年種植面積有減少趨勢，整體收穫面積及產量較上月減少。預估本月收穫面積61公頃，較上月87公頃減少30%；產量為2,795公噸，較上月產量4,152公噸，減產33%，與109年同期產量2,976公噸比較，則減產6%。

花椰菜（青花）收穫面積28公頃，產量570公噸，較上月減產54%；花椰菜（白花）收穫面積87公頃，產量2,310公噸，較上月減產6%。

花椰菜喜冷涼氣候，本月氣候漸不適合生育，整體收穫面積及產量減少。本月青花菜主要產區為雲林及高雄，預估收穫面積28公頃，較上月58公頃減少52%；產量為570公噸，較上月產量1,230公噸，減產54%，與109年同期產量521公噸比較，則增產10%。

本月白花椰菜主要產區為彰化及高雄，以種植耐熱品種為主。預估收穫面積87公頃，較上月93公頃減少6%；產量為2,310公噸，較上月產量2,459公噸，減產6%，與109年同期產量2,765公噸比較，則減產16%。

係高雄產區 109 年一期
作種植面積較常年增
加，本年相對減少，
且受乾旱缺水影響，
單位產量略減。



短期葉菜收穫面積 574 公頃，產量 1 萬 1,007 公噸，較上月減產 13%。

短期葉菜（包含不結球白菜及薺菜）主要產區為雲林縣，次為新北、桃園及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜、青梗白菜（青江菜）及油菜等。受新冠肺炎疫情影響，雲林產區預估種植面積略減。預估本月收穫面積 574 公頃，較上月 630 公頃減少 9%；產量為 1 萬 1,007 公噸，較上月產量 1 萬 2,597 公噸，減產 13%，與 109 年同期產量 1 萬 1,312 公噸比較，則減產 3%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積 700 公頃，產量 4,719 公噸，較上月減產 22%。

胡瓜屬連續採收型作物，依果形可分為大胡瓜和小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，主要產區為屏東縣，次為彰化、雲林及高雄等地。上月為各產區胡瓜盛產期，本月產量減少。預估本月收穫面積 700 公頃，產量為 4,719

公噸，較上月產量 6,032 公噸，減產 22%，與 109 年同期產量 5,781 公噸比較，則減產 18%。係受乾旱缺水影響，雲林及苗栗產區種植面積減少，且部分產區有單位產量減少情形。

絲瓜收穫面積 1,144 公頃，產量 4,959 公噸，較上月減產 30%。

絲瓜生育期長可連續採收，且對環境適應性強。本月中南部各產區絲瓜為一期作採收後期，收穫面積及產量較上月減少。預估本月收穫面積 1,144 公頃，產量為 4,959 公噸，較上月產量 7,119 公噸，減產 30%，與 109 年同期產量 5,608 公噸比較，則減產 12%。係部分產區受乾旱缺水影響，單位產量略減，整體產量較上年同期減少。

西瓜收穫面積 859 公頃，產量 2 萬 651 公噸，較上月減產 55%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充足的氣候。本月西瓜生產以花蓮為大宗，雲林及臺南產區則主要集中於上月採收，本月收穫面積及產量減少。北部、宜蘭及屏東產區上年因 5 月豪雨導致減產，本年恢復常態而單位產量增加。惟雲林產區部分河川地進行疏濬工程，且因上年期價格不佳，部分產區本年種植面積略減。預估本月收穫面積 859 公頃，較上月 1,891 公

頃減少 55%；產量為 2 萬 651 公噸，較上月產量 4 萬 6,277 公噸，減產 55%，與 109 年同期產量 2 萬 3,062 公噸比較，則減產 10%。

三、根莖類

青蔥收穫面積 340 公頃，產量 8,032 公噸，較上月減產 10%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥、粉蔥及大蔥，主要產區為彰化、雲林及宜蘭等地。宜蘭產區青蔥日前受連續降雨影響，一期作蔥苗品質不佳，且近期有病蟲害情形，單位產量較上年同期減少。臺中、彰化及雲林產區受乾旱缺水影響，單位產量亦略有減少。預估本月收穫面積 340 公頃，與上月 342 公頃相當；產量為 8,032 公噸，較上月產量 8,941 公噸，減產 10%，與 109 年同期產量 8,311 公噸比較，則減產 3%。

花卉類

菊花收穫面積 43 公頃，產量 1,429 萬枝，較上月產量減少 7%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗等地。生長特性於日照時間漸短行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9 月開花）、秋菊（10～11 月開花）及寒菊

（12 月～翌年 1 月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。本月氣候逐漸炎熱，市場需求量減少，預估本月收穫面積與產量減少。預估本月收穫面積為 43 公頃，較上月 46 公頃減少 7%，較 109 年同期 47 公頃減少 9%；本月產量預估為 1,429 萬枝，較上月 1,543 萬枝產量減少 7%，較 109 年同期 1,526 萬枝產量減少 6%。



火鶴花收穫面積 149 公頃，產量 344 萬枝，較上月產量增產 4%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、下營、玉井、高雄市內門、臺中市后里、外埔、北屯、南投縣埔里、屏東縣新埤、長治等地。因火鶴花喜溫暖高濕度環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年 5～6 月及 9～10 月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月為盛產期，目前因年初寒流受損田區已逐漸恢復生長勢，惟部分產區有受缺水影響。預估本月收穫面積 149 公頃，與上月面積相當，較 109 年同期 152 公頃減少 2%；產量 344 萬枝，較上月 330 萬枝增產 4%，較 109 年同期 387 萬枝，則減產 11%。

文心蘭收穫面積244公頃，產量552萬枝，較上月產量增加6%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、雲林縣古坑、斗南、嘉義縣大林、民雄、番路、梅山、屏東縣長治、里港、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5~6月及9~10月為盛產期。本月進入文心蘭盛產期。預估本月收穫面積244公頃，與上月面積相當，較109年240公頃同期增加2%；產量為552萬枝，較上月523萬枝產量增加6%，較109年同期產量544萬枝增產1%。

雜糧類

一期作落花生較常年同期作減產22%。

本年一期作落花生主產地雲林縣因水稻受乾旱影響改種旱作，種植面積略有增加，其他地區受乾旱影響種植面積較往年減少。預測本期作栽培面積6,526公頃，較常年同期作7,457公頃，減少12%；與上年同期作面積6,459公頃相較，增加1%。產量部分，本年雲林產區雖受乾旱影響，單位面積產量較正常年減少，惟因109年單位面積產量受豪雨影響偏低，相較下本年單位面積產量

較109年略高；西部其他各產區則受乾旱影響單位面積產量偏低，預估本期作落花生總產量1萬5,768公噸，較常年同期作產量2萬133公噸，減產22%；若與上年同期作產量1萬5,099公噸比較，則增產4%。

一期作甘藷總產量較常年同期作減產20%。

臺灣地區因氣候溫暖，各地均可周年種植甘藷，栽培季節可分為一期作、二期作及裡作，主要產地以雲林、彰化、臺中、臺南、屏東及嘉義等縣市最多。其用途早期為人類的輔助食糧及家畜的混合飼料，近年則以鮮食為主，部分用於食品加工，其營養成分除澱粉、脂肪和蛋白質外，含有豐富的維生素C、β胡蘿蔔素、維生素B群，被視為膳食纖維食品，廣受消費者青睞。

本年一期作甘藷生產主要集中在雲林、彰化及臺中地區，尤以雲林縣生產面積最大。面積部分，因年初持續乾旱少雨，影響農民種植意願，總體預估本期作甘藷種植面積1,880公頃，較常年同期作2,434公頃，減少23%；較上年同期作2,249公頃比較，則減少16%。產量部分，預測本期作總產量4萬4,431公噸，較常年同期作產量5萬5,766公噸，減產20%；若與上年同期作產量5萬3,629公噸比較，則減產17%。