

110 年 8 月 主要農作物生產預測



李芳琳¹ 劉彥彤¹ 謝廉一¹

果品類

香蕉收穫面積 1 萬 5,211 公頃，總產量 36 萬 2,499 公噸，較常年增產 3%；秋冬蕉產量 16 萬 7,136 公噸，較 109 年增產 6%。

香蕉為周年性果樹，主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大宗主產區，依採收季節可分為春夏蕉（2 月下旬～9 月中旬採收）及秋冬蕉（9 月下旬～隔年 2 月上旬採收）。據各產區觀測結果，本年香蕉面積受檳榔廢園轉作影響略有增加，另受年初低溫、乾旱影響，部分地區有葉片黃化及產期延後情形，相較於近 5 年有豪雨、颱風等災害影響，110 年整體產量相對略有增加，春夏蕉產量亦評估因產期延後至秋冬蕉，導致本年秋冬蕉略有增加。110 年預估收穫面積 1 萬 5,211 公頃，較 109 年 1 萬 4,968 公頃增加 2%，較常年平均略減 1%；產量 36 萬 2,499 公噸，



較 109 年 35 萬 9,600 公噸增產 1%，較常年平均 35 萬 1,628 公噸，則增產 3%。另本年秋冬蕉預估收穫面積為 7,481 公頃，較 109 年 7,095 公頃略增 5%；產量 16 萬 7,136 公噸，較 109 年 15 萬 8,356 公噸增產 6%。

番荔枝收穫面積 5,569 公頃，總產量 5 萬 8,445 公噸，較常年增產 6%；夏果產量 1 萬 8,943 公噸，較 109 年增產 5%。

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東及臺南，其中臺東縣種植面積全臺總面積 9 成以上，栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，種植面積約占各半。大目種釋迦透過修剪一年可收夏果及冬果 2 期，夏果主產期 7～10 月、冬果 12 月～隔年 4 月。鳳梨釋迦在臺灣多以夏季修剪配合夜間燈照調整產期為 12 月～隔年 4 月，避開夏果採後裂果的情形。110 年夏果部分各主產區生育良好，目前依不同地區分別進入幼果期至採收期，臺東縣近年來收穫面積持

註 1：行政院農業委員會農糧署。

續微幅增加，預估110年全年收穫面積5,569公頃，較109年略增1%，較常年增加3%；產量5萬8,445公噸，較109年產量5萬5,626公噸增產5%，較常年5萬4,897公噸增產6%；夏果預估收穫面積5,569公頃，較109年5,516公頃略增1%；產量1萬8,943公噸，較109年1萬8,087公噸增產5%。

番石榴收穫面積7,752公頃，總產量20萬5,272公噸，較常年增產17%；下半年果產量11萬589公噸，較109年增產9%。

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1～6月）及下半年果（7～12月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6～9月水果盛產期及颱風豪雨季節。近5年間番石榴產量受105年風災及107、108年豪雨及水災影響，產量略有減少。109年至本年初氣候平穩，生長狀況良好，惟因3～5月雨水不足，致上半年產量略微下降，5月底以來持續降雨，評估下半年果產量提升，又因番石榴技術門檻較低，本年收穫面積略有增加。預估110年收穫面積7,752公頃，較



109年7,596公頃增加2%，較常年7,337公頃增加6%；產量20萬5,272公噸，較109年19萬8,054公噸增產4%，較常年17萬6,108公噸，則增產17%。下半年果預估收穫面積7,752公頃，較109年7,596公頃增產2%；產量11萬589公噸，較109年10萬1,772公噸增產9%。

木瓜收穫面積2,729公頃，產量13萬9,572公噸，較常年增產12%；夏果產量8萬5,992公噸，較109年減產1%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為臺南、屏東、南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調控果實產季於價高或貯藏病害較少的季節，全年可採收。木瓜不耐寒、根部忌淹水，其近5年產量受105年風災及107年、108年豪雨、水災及颱風影響相對降低。本年產量原略受3～5月乾旱影響，惟5月以來降雨明顯，對產量提升有助益，又本年部分產區新植面積轉為可收穫面積。110年預估收穫面積2,729公頃，較109年2,681公頃增加2%，較常年2,606公頃增加5%；產量13萬9,572公噸，較109年13萬8,333公噸略增1%，較常年12萬5,012公噸，則增產12%。夏果預估收穫面積



2,729公頃，較109年2,681公頃略增2%；產量8萬5,992公噸，與109年8萬6,772公噸相當。

龍眼收穫面積1萬465公頃，產量6萬2,743公噸，較常年減產7%。

龍眼為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以粉殼種為主。主產區分布於臺南、臺中、高雄、南投及嘉義等縣市，產期集中於7~9月，可利用分區種植不同產期品種實施產期調節。龍眼適應性廣，栽培管理方式通常較其他經濟果樹粗放，果實除可鮮食外，亦可烘培做龍眼乾及製成其他加工產品，分散市場。近年因受人口老齡化、荔枝椿象防治等影響，部分產區有轉作及廢園情形，致種植面積略有下降，本年開花情形良好，惟受3~5月乾旱缺水影響，部分產區有結果率偏差、小果乾枯等情形，尤以山區較為嚴重，5月下旬以來雨水漸增，部分產區產量稍有恢復。預估110年收穫面積1萬465公頃，較109年1萬602公頃略減1%，較常年1萬871公頃減少4%；產量6萬2,743公噸，較109年6萬4,543公噸減產3%，較常年6萬7,338公噸，則減產7%。

文旦柚收穫面積4,009公頃，產量7萬5,226公噸，與常年相比增產1%。

文旦柚主產區分布於臺南、花蓮、新北及苗栗等縣市。果實成熟期



一般於農曆節氣「白露」前後，依農民留花（果）時間及種植地區不同而異，為中秋節應景果品。本年雖因部分產區達可採收株齡之面積增加，致較上年收穫面積略增，但相較於近年來部分果園因農民老化無力管理及廢園，收穫面積仍略較常年減少。本年雖有部分產區受3~5月乾旱影響致落果情形增加，但整體產量受影響不大。預估110年收穫面積4,009公頃，與109年3,999公頃相當，較常年4,077公頃略減2%；產量7萬5,226公噸，較109年7萬3,445公噸略增2%，與常年7萬4,549公噸增產1%。

椪柑收穫面積5,098公頃，產量10萬8,056公噸，較常年減產11%。

椪柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為嘉義、臺中及臺南等縣市，栽培品種以高牆系為主，

依採收時外觀又分為青皮椪柑及橙皮柑兩大類型，前者多分布於雲嘉



南地區，於10～11月採收供應鮮採市場，後者多分布於中北部地區，於11～12月採收後儲藏供應至隔年4月。本年部分產區受3～5月乾旱影響，導致著果率偏低，整體產量評估減產。預估收穫面積5,098公頃，較上年5,118公頃相當；產量10萬8,056公噸，較上年11萬7,010公噸減產8%，較常年12萬1,076公噸，則減產11%。

柿收穫面積4,980公頃，產量7萬1,244公噸，較常年增產11%。

柿為溫帶落葉果樹，品種可依是否能自然脫澀分為澀柿與甜柿兩大類，又臺灣主要栽培品種為澀柿的四周柿、牛心柿及甜柿的富有、次郎等。主產區以臺中種植面積占全臺種植面積6成以上最多，另有苗栗、嘉義、新竹、南投、臺東等產區。近幾年因部分產區農民年事漸高，收穫面積亦因廢園增加或轉作香蕉、番石榴、酪梨等作物減少；110年各產區已陸續進入生理落果期，評估產量雖受3～5月乾旱及6月豪雨致有部分落花、落果情形，相較於近5年屢有豪雨影響，產量仍相對增加。預估收穫面積4,980公頃，較上年5,012公頃減少1%，較常年5,184公頃減少4%；產量7萬1,244公噸，較上年6萬9,708公噸增產2%，較常年6萬4,363公噸，則增產11%。



紅龍果收穫面積2,785公頃，產量6萬9,394公噸，較常年增產3%。

紅龍果為多年生草本植物，主產區分布於彰化、南投、屏東及臺南等縣市，主要產期為6～10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。前幾年因紅龍果價格佳，農民陸續由休耕田區或其他果樹改種，種植面積逐年大幅成長。惟近3年市場價格逐漸平緩，種植面積成長幅度亦隨之趨緩。本年3～5月受乾旱雨水不足略有影響開花情形或果重降低，但因紅龍果可多批次開花結果，5月開始降雨後，評估產量逐漸恢復。預估110年收穫面積2,785公頃，較上年2,820公頃略減1%，與常年2,773公頃相當；產量6萬9,394公噸，較上年7萬1,211公噸減產3%，較常年6萬7,622公噸，則增產3%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積447公頃，產量2萬4,490公噸，較上月減產23%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。夏季甘藍以宜蘭、臺

中及南投等高冷地產區為主；彰化及雲林等平地產區則因氣候炎熱，收穫面積及產量少。本月為期作生產交替期，為預防颱風災害，宜蘭產區部分面積提早於7月採收，收穫面積及產量較上月及上年同期減少。預估本月收穫面積447公頃，較上月582公頃減少23%；產量為2萬4,490公噸，較上月產量3萬1,802公噸，減產23%，與109年同期產量3萬934公噸比較，則減產21%。

結球白菜收穫面積37公頃，產量1,775公噸，較上月增產4%。

結球白菜喜冷涼氣候，夏季高溫環境不利結球白菜生育，以種植耐熱品種為主。主要產區為雲林及彰化，近年因病蟲害，栽培管理不易，種植面積有減少趨勢，整體收穫面積及產量較上年減少。預估本月收穫面積37公頃，較上月39公頃減少4%；產量為1,775公噸，較上月產量1,700公噸，增產4%，與109年同期產量2,342公噸比較，則減產24%。

花椰菜（青花）收穫面積7公頃，產量152公噸，較上月減產35%；花椰菜（白花）收穫面積59公頃，產量1,670公噸，較上月減產3%。

花椰菜喜冷涼氣候，夏季高溫環境不利生長及花球發育，整體收穫面積及

產量少。本月青花菜主要產區為雲林及高雄，預估收穫面積7公頃，較上月12公頃減少38%；產量為152公噸，較上月產量235公噸，減產35%，與109年同期產量116公噸比較，則增產32%。

本月白花椰菜主要產區為彰化及高雄，以種植耐熱品種為主。預估收穫面積59公頃，較上月61公頃減少4%；產量為1,670公噸，較上月產量1,725公噸，減產3%，與109年同期產量2,003公噸比較，則減產17%。係受疫情影響需求減少，彰化產區本年二期作種植面積較常年減少，致收穫面積及產量較上年同期減少。

短期葉菜收穫面積591公頃，產量1萬1,917公噸，較上月增產5%。

短期葉菜（包含不結球白菜及薺菜）主要產區為雲林縣，次為新北、桃園及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜、青梗白菜（青江菜）及油菜等。高雄產區受8月上旬西南氣流豪雨影響，單位產量略減。預估本月收穫面積591公頃，較上月575公頃增加3%；產量為1萬1,917公噸，較上月產量1萬1,401公噸，增產5%，與109年同期產量1萬2,042公噸比較，則減產1%。





二、瓜果類

胡瓜收穫面積 582 公頃，產量 3,614 公噸，較上月增產 38%。

胡瓜屬連續採收型作物，依果形可分為大胡瓜和小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為二期作生產期，主要產區為屏東縣，次為彰化、雲林及高雄等地。雲林二期作胡瓜於本月開始採收，整體收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積 582 公頃，產量為 3,614 公噸，較上月產量 2,628 公噸，增產 38%，與 109 年同期產量 3,885 公噸比較，則減產 7%。

絲瓜收穫面積 1,062 公頃，產量 3,601 公噸，較上月減產 8%。

絲瓜生育期長可連續採收，且對環境適應性強。本月為二期作生產期，主要產區為彰化、南投、嘉義、臺南、高雄及屏東等地。南投及屏東產區受豪雨影響，有落花或授粉不良等情形，致單位產量較上年同期減少。預估本月收穫面積 1,062 公頃，

產量為 3,601 公噸，較上月產量 3,908 公噸，減產 8%，與 109 年同期產量 3,920 公噸比較，則減產 8%。

西瓜收穫面積 914 公頃，產量 1 萬 8,614 公噸，較上月減產 34%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充足的氣候。本月西瓜主要產區為花蓮、雲林及臺南等地，為二期作採收期，北部及宜蘭產區一期作西瓜則多於上月採收完畢，各產區收穫面積及產量互有增減。估本月收穫面積 914 公頃，較上月 1,090 公頃減少 16%；產量為 1 萬 8,614 公噸，較上月產量 2 萬 8,092 公噸，減產 34%，與 109 年同期產量 2 萬 3,984 公噸比較，則減產 22%。係本年花蓮及臺南產區二期作西瓜種植面積減少，且部分產區受 8 月上旬西南氣流豪雨影響，田區淹水致果實受損，單位產量減少，預本月收穫面積及產量較上年同期減少。

三、根莖類

青蔥收穫面積 380 公頃，產量 8,497 公噸，較上月減產 2%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥、粉蔥及大蔥，主要產區為彰化、雲林及宜蘭等地。宜蘭產區青蔥近期受病蟲害影響，單位產量較上年同期減少。臺中、彰化及雲林產區因日前乾旱缺

水，近期又逢豪雨，單位產量亦略減少。預估本月收穫面積380公頃，與上月381公頃相當；產量為8,497公噸，較上月產量8,651公噸，減產2%，與109年同期產量8,643公噸比較，亦減產2%。

花卉類

菊花收穫面積35公頃，產量1,068萬枝，較上月產量減少28%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗等地。生長特性於日照時間漸短行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9月開花）、秋菊（10～11月開花）及寒菊（12月～翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。本月非盛產期，又因部分產區受8月上旬西南氣流豪雨影響，預估產量減少。預估本月收穫面積為35公頃，較上月47公頃減少26%，較109年同期39公頃減少12%；本月產量預估為1,068萬枝，較上月1,494萬枝產量減少28%，較109年同期1,232萬枝產量減少11%。



火鶴花收穫面積147公頃，產量272萬枝，較上月產量減產7%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、下營、玉井、高雄市內門、臺中市后里、外埔、北屯、南投縣埔里、屏東縣新埤、長治等地。因火鶴花喜溫暖高濕度環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5～6月及9～10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月非盛產期，部分產區火鶴花受年初低溫受損，導致凍傷、新葉萎縮等現象，目前逐漸恢復。預估本月收穫面積147公頃，與上月面積相當，較109年同期145公頃增加1%；產量272萬枝，較上月294萬枝減少7%，較109年同期278萬枝，則減產2%。



文心蘭收穫面積239公頃，產量393萬枝，較上月產量減產10%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、雲林縣古坑、斗南、嘉義縣大林、民雄、番路、梅山、屏東縣長治、里港、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5～6月及9～

10月為盛產期。本月非文心蘭盛產期，臺中部分產區受到本年3～5月高溫乾旱影響，導致部分植株有假球莖萎縮及花芽減少分化的現象，評估整體產量減少。預估本月收穫面積239公頃，與上月面積相當，較109年231公頃同期增加3%；產量為393萬枝，較上月438萬枝產量減少10%，較109年同期產量425萬枝減產8%。

雜糧類

二期作甘藷種植面積較上年同期作減少8%、較常年同期作減少6%。

110年二期作甘藷生產仍以雲林縣生產面積最多，占臺灣地區生產面積5成以上，彰化、臺中、新北、苗

栗及花蓮地區次之。本期作各產區種植面積部分，雲林產區雖因去年同期價格較好，但今年一期作價格下跌，使農民種植意願略減；臺中地區部分田區改種薑；苗栗產區因一期作停灌休耕田區在二期作得繼續休耕；新北產區部分田區提早於一期作種植，整體面積較上年及常年同期作減少。據主產區直轄市、縣（市）政府觀測，預估本期作種植面積3,843公頃，較上年同期作4,200公頃，減少8%，若與常年同期作4,077公頃比較，則減少6%。

