

111 年 8 月 主要農作物生產預測



殷瑞妤¹ 洪思賢¹ 李芳琳¹ 謝廉一¹

果品類

香蕉收穫面積 1 萬 4,685 公頃，總產量 34 萬 8,343 公噸，與常年相當；秋冬蕉產量 16 萬 5,206 公噸，較 110 年增產 11%。

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2 月下旬～9 月中旬採收）及秋冬蕉（9 月下旬～翌年 2 月上旬採收）。111 年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響，廢園有增加之情形，另 110 年 8 月豪雨後，部分產區至 111 年上半年始陸續完成復耕，致 111 年收穫面積略有減少。111 年春夏蕉產量，受上揭因素及年初溫度冷涼致部分產區延後採收影響，略有減少；惟 111 年雨水充足，且因 110 年 8 月豪雨後陸續復耕田區部分可於 111 年秋冬蕉採收，評估秋冬蕉較 110 年受 8 月上旬西南氣流豪雨影響，產量相對增加。111 年預估收穫面積 1 萬 4,685 公頃，較 110 年 1 萬 5,043 公頃減少 2%，較常年平均 1 萬 5,289 公頃減少 4%；產量 34 萬 8,343 公噸，較 110 年 33 萬 7,144 公噸增產 3%，與常年平均 34 萬 8,007 公噸相當。111 年秋冬蕉預估收穫面積為 7,330 公頃，較 110 年 7,412 公頃

減少 1%；產量 16 萬 5,206 公噸，與 110 年 14 萬 9,461 公噸相當。

番荔枝收穫面積 5,375 公頃，總產量 4 萬 8,995 公噸，較常年減產 9%；夏果產量 1 萬 2,751 公噸，較 110 年減產 7%。

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積 9 成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪一年可收夏果及冬果 2 期，夏果主產期 7 月～10 月、冬果 12 月～隔年 4 月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，以夏季修剪配合夜間燈照調整產期為 12 月～隔年 4 月，避開夏果採後裂果的情形。111 年部分大目釋迦夏果受降雨影響開花及授粉，評估產期略有延後及產量略減。預估 111 年番荔枝收穫面積 5,375 公頃，較 110 年 5,439 公頃略減 1%，與常年 5,396 公頃相當；產量 4 萬 8,995 公噸，較 110 年產量 5 萬 475 公噸減產 3%，較常年 5 萬 3,792 公噸，則減產 9%；夏果預估收穫面積 5,375 公頃，較 110 年 5,439 公頃略減 1%；產量 1 萬 2,751 公噸，較 110 年 1 萬 3,660 公噸，則減產 7%。

註 1：行政院農業委員會農糧署。

番石榴收穫面積7,850公頃，總產量20萬5,645公噸，較常年增產15%；下半年果產量10萬5,573公噸，較110年增產10%。

番石榴為熱帶常綠果樹，周年可開花結實，主產區分布於高雄、臺南、彰化及屏東等縣市，品種以珍珠拔為大宗，並依採收季節分為上半年果（1月～6月）及下半年果（7月～12月）。番石榴運用不同修剪時期調節生產，以配合市場需求，並可避開6月～9月水果盛產期及颱風豪雨季節。本年面積增加，主要係近幾年農民考量栽培技術門檻及市場價格，收穫面積有增加趨勢；產量相對常年增加，則係近5年間，107、108、110年有豪雨、水災、乾旱等影響，111年上半年雖陸續有降雨，但整體對番石榴產區影響不大，產量評估增加。預估111年收穫面積7,850公頃，較110年7,775公頃增加1%，較常年7,402公頃增加6%；產量20萬5,645公噸，較110年18萬4,952公噸增產11%，較常年17萬8,319公噸，則增產15%。下半年果預估收穫面積7,850公頃，較110年7,775公頃略增1%；產量10萬5,573公噸，較110年9萬5,730公噸，則增產10%。

木瓜收穫面積2,621公頃，產量12萬9,638公噸，較常年增產5%；夏果產量7萬6,588公噸，較110年增產1%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為臺南、屏東、南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或貯藏病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3月～8月）

及冬果（9月～翌年2月）。木瓜不耐寒，根部忌淹水，111年5月～6月降雨造成部分產區果實損害，惟相較於近5年產量受107、108、110年豪雨、水災影響，產量評估相對提升。111年預估收穫面積2,621公頃，較110年2,680公頃減少2%，與常年2,625公頃相當；產量12萬9,638公噸，較110年11萬8,834公噸增產9%，較常年12萬3,468公噸，則增產5%。夏果預估收穫面積2,621公頃，較110年2,680公頃減少2%；產量7萬6,588公噸，較110年7萬5,695公噸，則增產1%。

文旦柚收穫面積3,866公頃，產量6萬9,322公噸，較常年減產7%。

文旦柚為柑桔類果樹，主產區分布於臺南、花蓮、新北及苗栗等縣市。果實成熟期一般於農曆節氣「白露」前後，依農民留花（果）時間及種植地區不同而異，為中秋節應景果品。近年來部分果園因農民老化無力管理及廢園，致收穫面積略減，產量部分，111年受3月～6月間降雨影響，部分產區有授粉不良、著果不佳等情形，評估產量略減。預估111年收穫面積3,866公頃，較110年3,936公頃略減2%，較常年4,016公頃減少4%；產量6萬9,322公噸，較110年7萬1,202公噸減產3%，較常年7萬4,549公噸，則減產7%。

椪柑收穫面積5,032公頃，產量10萬2,317公噸，較常年減產15%。

椪柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為嘉義、臺中及臺南等縣市，栽培品種以

高牆系為主，依採收時外觀又分為青皮椪柑及橙皮柑兩大類型，前者多分布於雲嘉南地區，於10月～11月採收供應鮮採市場，後者多分布於中北部地區，於11月～12月採收後儲藏供應至隔年4月。111年部分產區受果園人力老化或轉作等影響，面積略減，又開花著果期間受3月～5月間降雨影響，部分產區有落花落果或著果率不佳之情形，整體產量評估減少。預估111年收穫面積5,032公頃，較110年5,092公頃略減1%，較常年5,306公頃減少5%；產量10萬2,317公噸，較110年10萬5,397公噸減產3%，較常年12萬1,076公噸，則減產15%。

柿收穫面積4,897公頃，產量5萬8,404公噸，較常年減產15%。

柿為溫帶落葉果樹，品種可依是否能自然脫澀分為澀柿與甜柿兩大類，又臺灣主要栽培品種為澀柿的四周柿、牛心柿及甜柿的富有、次郎等。主產區以臺中種植面積占全臺種植面積6成以上最多，另有苗栗、嘉義、新竹、南投、臺東等產區。近幾年因部分產區農民年事漸高，收穫面積亦因廢園增加或轉作香蕉、番石榴、酪梨等作物減少，111年受開花期遇連續降雨致授粉不良，結果率不佳，結果期又遇5月～6月降雨影響致生理落果加劇，產量較上年及常年減少。預估111年收穫面積4,897公頃，較上年4,953公頃減少1%，較常年5,109公頃減少4%；產量5萬8,404公噸，較上年7萬2,662公噸減產20%，較常年6萬8,495公噸，則減產15%。

紅龍果收穫面積2,686公頃，產量6萬6,520公噸，較常年減少2%。

紅龍果為多年生草本植物，主產區分布於彰化、南投、屏東及臺南等縣市，主要產期為6月～10月。利用夜間燈照技術，部分產區可延長採收期至翌年3月或提早至5月，亦可調控留花留果數，提高果實重量及品質。紅龍果約自100年起種植面積逐年大幅成長，自106年起種植面積始大致持平，本年因主產縣市部分農民考量市場因素，轉作其他作物。110年受年初乾旱及8月豪雨影響，有開花率降低、落花等現象造成產量略減，111年植株生育尚佳，受5月～6月降雨影響不大，惟因面積略減，整體產量略減。預估111年收穫面積2,686公頃，較上年2,774公頃減少3%，較常年2,793公頃減少4%；產量6萬6,520公噸，較上年6萬4,730公噸增產3%，與常年6萬7,622公噸，則減產2%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積618公頃，產量3萬7,229公噸，較上月增產24%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。夏季甘藍以宜蘭、臺中及南投等高冷地產區為主；彰化及雲林等平地產區則因氣候炎熱，收穫面積及產量少。本月為期作生產交替期，宜蘭產區上年部分面積提早於7月採收，且南投產區本年5、6月種植時間較為集中，致收穫面積及產量均較上月及上年同期增加。預估本月收穫面積618公頃，較上月528公頃增加

17%；產量為3萬7,229公噸，較上月產量3萬109公噸，增產24%，與110年同期產量2萬2,788公噸比較，則增產63%。

結球白菜收穫面積67公頃，產量3,064公噸，較上月減產3%。

結球白菜喜冷涼氣候，夏季高溫環境不利結球白菜生育，以種植耐熱品種為主。主要產區為彰化，據產地觀測本年栽培管理有所改善，整體收穫面積及產量均較上年增加。預估本月收穫面積67公頃，較上月75公頃減少10%；產量為3,064公噸，較上月產量3,153公噸，減產3%，與110年同期產量1,557公噸比較，則增產97%。

花椰菜（青花）收穫面積12公頃，產量233公噸，較上月減產2%；花椰菜（白花）收穫面積63公頃，產量1,704公噸，較上月減產7%。

花椰菜喜冷涼氣候，夏季高溫環境不利生長及花球發育，整體收穫面積及產量少。本月青花菜主要產區為彰化、雲林及高雄，預估收穫面積12公頃，與上月相當；產量為233公噸，較上月產量239公噸，減產2%，與110年同期產量144公噸比較，則增產62%。係彰化及雲林產區本年二期作種植面積增加。

本月白花椰菜主要產區為彰化，以種植耐熱品種為主。預估收穫面積63公頃，較上月68公頃減少7%；產量為1,704公噸，較上月產量1,824公噸，減產7%，與110年同期產量746公噸比較，則增產128%。係彰化產區本年二期作種植面積增加。

短期葉菜收穫面積587公頃，產量1萬1,750公噸，較上月增產9%。

短期葉菜（包含不結球白菜及蕓菜）主要產區為雲林縣，次為桃園及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜、青梗白菜（青江菜）及油菜等。部分產區預期疫情趨緩，市場需求恢復，增加二期作種植面積。預估本月收穫面積587公頃，較上月545公頃增加8%；產量為1萬1,750公噸，較上月產量1萬790公噸，增產9%，與110年同期產量1萬513公噸比較，則增產12%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積646公頃，產量4,046公噸，較上月增產54%。

胡瓜屬連續採收型作物，依果形可分為大胡瓜和小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為二期作生產期，主要產區為屏東縣，次為彰化、雲林及高雄等地。雲林二期作胡瓜於本月開始採收，整體收穫面積及產量較上月增加。主要產區上年多受8月上旬西南氣流豪雨影響，單位產量減少，本年恢復正常生長，收穫面積及產量均較上年同期增加。預估本月收穫面積646公頃，產量為4,046公噸，較上月產量2,633公噸，增產54%，與110年同期產量2,931公噸比較，則增產38%。

絲瓜收穫面積1,097公頃，產量3,640公噸，與上月相當。

絲瓜生育期長可連續採收，且對環境適應性強。本月為二期作生產期，主要產

區為南投、嘉義、臺南、高雄及屏東等地。預估本月收穫面積1,097公頃，產量為3,640公噸，與上月相當，與110年同期產量3,231公噸比較，則增產13%。係本年嘉義產區二期作絲瓜種植面積增加，且部分產區上年受8月上旬西南氣流豪雨影響，有落花或授粉不良等情形，單位產量減少，本年恢復正常生長。

西瓜收穫面積958公頃，產量1萬8,648公噸，較上月減產16%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充足的氣候。本月西瓜主要產區為雲林、臺南及花蓮等地，為二期作採收期。預估本月收穫面積958公頃，較上月1,074公頃增加2%；產量為1萬8,648公噸，較上月產量2萬2,175公噸，減產16%，與110年同期產量1萬5,947公噸比較，則增產17%。係本年臺南及花蓮產區二期作西瓜種植面積增加，且部分產區上年受8月上旬西南氣流豪雨影響，田區淹水致果實受損，單位產量減少，本年恢復正常生長，收穫面積及產量均較上年同期增加。

三、根莖類

青蔥收穫面積315公頃，產量7,311公噸，較上月增產21%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥、粉蔥及大蔥，主要產區為宜蘭、彰化及雲林等地。彰化產區受5、6月連續降雨影響，青蔥提早採收，致7月收穫面積較上年同期

減少。預估本月收穫面積315公頃，較上月265公頃增加19%；產量為7,311公噸，較上月產量6,049公噸，增產21%，與110年同期產量7,709公噸比較，則減產5%。

花卉類

菊花收穫面積22公頃，產量674萬枝，較上月產量減產36%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5月～9月開花）、秋菊（10月～11月開花）及寒菊（12月～翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。本月天氣炎熱，且逢期作交替，評估本月可收穫面積及產量減少。預估本月收穫面積為22公頃，較上月33公頃減少35%，較110年同期30公頃減少29%；本月產量預估為674萬枝，較上月1,058萬枝產量減少36%，較110年同期753萬枝產量減產10%。

洋桔梗收穫面積4公頃，產量107萬枝，與上月產量相當。

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏15度～25度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等鄉鎮。洋桔梗種植在冬季裡作，本月非盛產期，評估本月產量

減少。預估本月可採收面積為4公頃，與上月4公頃相當，較上年3公頃增加49%；產量為107萬枝，與上月107萬枝相當，較上年76萬枝增產42%。

火鶴花收穫面積141公頃，產量259萬枝，較上月減產10%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。因火鶴花喜溫暖高濕度環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5月～6月及9月～10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月非火鶴花盛產期，天氣漸漸炎熱，評估本月產量減少。預估本月收穫面積141公頃，與上月面積相當，較110年同期147公頃減少4%；產量259萬枝，較上月產量289萬枝減產10%，較110年同期260萬枝減產1%。

文心蘭收穫面積254公頃，產量360萬枝，較上月產量減產20%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境

多為網室栽培，每年5月～6月及9月～10月為盛產期。本月非文心蘭盛產期，天氣漸漸炎熱，評估本月產量減少。預估本月收穫面積254公頃，與上月面積相當，較110年239公頃同期增加6%；產量為360萬枝，較上月產量448萬枝減產20%，較110年同期產量380萬枝減產5%。

雜糧類

二期作甘藷種植面積較上年同期作增加12%、較常年同期作增加2%。

臺灣地區因氣候溫暖，各地均可周年種植甘藷，栽培季節可分為裡作、一期作及二期作，主要產地以雲林、彰化、臺中、臺南、屏東及嘉義等縣市最多。其用途早期為人類的輔助食糧及家畜的混合飼料，近年則以鮮食為主，部分用於食品加工，被視為膳食纖維食品，廣受消費者青睞。

111年二期作甘藷生產仍以雲林縣生產面積最多，占臺灣地區生產面積5成以上，彰化、臺中、新北、苗栗及花蓮地區次之。本期作各產區種植面積部分，雲林產區因110年8月上旬豪雨，部分產區嚴重缺株致收穫面積明顯減少，本年恢復種植使面積增加；彰化地區契作面積減少而有下降；臺中地區部分一期作田區改於二期種植，面積略增，整體面積較上年及常年同期作增加。預估本期作種植面積3,791公頃，較上年同期作3,374公頃，增加12%，若與常年同期作3,728公頃比較，則增加2%。