



112 年 1 月 主要農作物生產預測

殷瑞妤¹ 洪思賢¹ 李芳琳¹ 謝廉一¹

果品類

111 年香蕉收穫面積 1 萬 4,667 公頃，總產量 35 萬 1,390 公噸，較常年略增 1%；秋冬蕉產量 16 萬 6,477 公噸，較 110 年增產 11%。

香蕉主要產地分布於中南部及東部地區，並以屏東縣為最大產區，依採收季節可分為春夏蕉（2 月下旬～9 月中旬採收）及秋冬蕉（9 月下旬～翌年 2 月上旬採收）。111 年綜合各產區觀測結果，部分產區受黃葉病、人口老化等影響，廢園有增加之情形，另 110 年 8 月豪雨後，部分產區至今年上半年始陸續完成復耕，致 111 年收穫面積略有減少。111 年春夏蕉產量，受上揭因素及年初溫度冷涼致部分產區延後採收影響，略有減少；惟本年雨水充足，且因 110 年 8 月豪雨後陸續復耕田區多於本年秋冬蕉採收，秋冬蕉較 110 年受 8 月上旬西南氣流豪雨影響，產量相對增加。111 年預估收穫面積 1 萬 4,667 公頃，較

110 年 1 萬 5,043 公頃減少 2%，較常年平均 1 萬 5,289 公頃減少 4%；產量 35 萬 1,390 公噸，較 110 年 33 萬 7,144 公噸增產 4%，較常年平均 34 萬 8,007 公噸略增 1%。111 年秋冬蕉預估收穫面積為 7,359 公頃，較 110 年 7,412 公頃減少 1%；產量 16 萬 6,477 公噸，較 110 年 14 萬 9,461 公噸，則增產 11%。

111 年番荔枝收穫面積 5,327 公頃，總產量 4 萬 5,183 公噸，較常年減產 16%；冬果產量 3 萬 2,879 公噸，較 110 年減產 12%。

番荔枝為熱帶常綠果樹，主產區為臺東縣，占全臺總種植面積九成以上，栽植品種主要為「釋迦」（俗稱大目釋迦）及「鳳梨釋迦」，種植面積約占各半。大目釋迦透過修剪一年可收夏果及冬果 2 期，夏果主產期 7～9 月、冬果 12 月～隔年 3 月。鳳梨釋迦在臺灣多只收冬果，以夏季修剪

註 1：行政院農業委員會農糧署。



配合夜間燈照調整產期為12月～隔年4月，避開夏果採後裂果的情形。111年鳳梨釋迦受外銷中國大陸受阻影響，部分農友陸續進行轉作或品種更新，並主動減少授粉或疏果，又部分主產鄉鎮受12月初高溫落果，致產量略減；大目釋迦本年夏果部分產區受降雨影響開花及授粉，略有影響產量。預估111年番荔枝收穫面積5,327公頃，較110年5,439公頃減少2%，較常年5,396公頃略減1%；產量4萬5,183公噸，較110年產量5萬475公噸減產10%，較常年5萬3,792公噸，則減產16%；冬果預估收穫面積5,327公頃，較110年5,439公頃減少2%；產量3萬2,879公噸，較110年3萬7,319公噸，則減產12%。

111年木瓜收穫面積2,612公頃，產量12萬9,564公噸，較常年增產5%；冬果產量5萬3,191公噸，較110年增產23%。

木瓜為熱帶果樹，主產區為臺南、屏東、南投等縣市，品種以台農2號為大宗。木瓜可連續開花著果，

並可藉由人為疏花疏果進行產期調節，適當調節果實於價高或貯藏病害較少的季節產出，因此全年可採收，依採收季節可分為夏果（3～8月）及冬果（9月～翌年2月）。111年受部分產區轉作其他作物、扣除廢園等影響，收穫面積略減，產量部分，111年5～6月降雨造成部分產區果實損害，惟相較於近5年產量受107、108、110年豪雨、水災影響，產量評估相對提升；尤其冬果部分，相對於110年8月豪雨影響，產量相對增產幅度較高。111年預估收穫面積2,612公頃，較110年2,680公頃減少3%，較常年2,625公頃略減1%；產量12萬9,564公噸，較110年11萬8,834公噸增產9%，較常年12萬3,468公噸，則增產5%。冬果預估收穫面積2,612公頃，較110年2,680公頃減少3%；產量5萬3,191公噸，較110年4萬3,139公噸，則增產23%。

111年金柑收穫面積237公頃，產量1,892公噸，較常年減產47%。

金柑為亞熱帶常綠果樹，栽培品種以長實金柑為主，因果色金黃美麗，又稱金棗。主要栽培地區為宜蘭縣，約占全臺金柑種植面積90%，主產期為每年11月～翌年2月。金柑除鮮食外亦可作為蜜餞加工原料，提高產品價值及農民收益，惟該產業受經

營者老化、山區管理不易、野生動物危害等因素，面積略有減少，111年主產區受7~8月降水不足及9~10月間陸續有豪雨影響，有開花著果批次減少、著果不良、落果、裂果、果實水傷等情形。111年預估收穫面積237公頃，較110年241公頃減少2%，較常年242公頃減少2%；產量1,892公噸，較110年3,135公噸減產40%，較常年3,543公噸，則減產47%。

111年茂谷柑收穫面積1,908公頃，產量34,839公噸，較常年增產8%。

茂谷柑為亞熱帶常綠果樹，主產區為臺中、雲林、嘉義、新竹及苗栗，主產期為1~2月。茂谷柑有隔年結果現象，透過適當的肥培管理及修剪，可減緩此現象，另適當的水分管理，也可避免裂果。茂谷柑由於糖度高風味佳、耐貯運、果形美觀，受消

費者喜愛，近年多有農友投入生產；本年部分產區開花著果期受降雨影響，有授粉不良、落果等情形。預估收穫面積1,908公頃，較110年1,863公頃增加2%，較常年1,751公頃增加9%；產量3萬4,839公噸，較110年3萬6,847公噸減產5%，較常年3萬2,305公噸，則增產8%。

112年蓮霧收穫面積2,894公頃，總產量4萬3,637公噸，較常年減產13%。

蓮霧為多年生常綠果樹，最大產區位於屏東縣，包含鹽埔、內埔、枋寮、林邊、南州及佳冬鄉，其餘產區如高雄市六龜鄉及嘉義縣梅山、中埔鄉。自然氣候環境下，蓮霧一般開花期南部約在3~5月，北部為5~7月，盛產期南部地區約在5~7月，而北部則為7~9月。鑑於夏季期間為各種水果生產旺季，市場競爭激烈，且逢雨季病蟲害危害品質，高屏地區蓮霧大都實施產期調節，利用環刻、淹水、斷根及蓋黑網等逆境處理配合

催花，將產期提早在11月~

翌年4月間採收，以生產

冬、春果，其他產區則

以夏果為主。蓮霧因管

理不易及生產成本高，

近5年收穫面積有下降

趨勢，主要係部分產區

囿於生產成本高、人力老



化、廢園增加所致，112年部分產區早花受高溫有裂果、病害等影響，又受12月中旬寒流影響造成部分產區落果、裂果，整體相較於111年受寒流落果之情形，產量再略減。112年預估收穫面積2,894公頃，與111年2,898公頃相當，較常年平均3,063公頃減少6%；產量4萬3,637公噸，較111年4萬7,002公噸減產7%，較常年5萬147公噸，則減產13%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積1,069公頃，產量5萬4,516公噸，較上月增產28%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候，本月為平地產區盛產期，主要產區為彰化、雲林、嘉義及臺南等地。宜蘭、臺中及南投等高冷地產區，雖種植面積減少，仍有甘藍持續採收，整體收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積1,069公頃，較上月868公頃增加23%；產量為5萬4,516公噸，較上月產量4萬2,480公噸，增產28%，與111年同期產量5萬6,547公噸比較，則減產4%。

結球白菜收穫面積216公頃，產量10,280公噸，較上月增產23%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。本月氣



候適合生長，彰化及雲林等主要產區收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積216公頃，較上月184公頃增加17%；產量為1萬280公噸，較上月產量8,337公噸，增產23%，與111年同期產量1萬2,182公噸比較，則減產16%。依據產地觀測，近年受氣候影響，栽培管理不易，農民種植意願消退，預估收穫面積及產量較111年同期減少。

青花菜收穫面積337公頃，產量6,157公噸，較上月增產84%；白花椰菜收穫面積221公頃，產量5,848公噸，較上月增產45%。

青花菜及白花椰菜喜冷涼氣候，本月氣候適合生長，收穫面積及產量增加。本月青花菜主要產區為雲林及嘉義，預估收穫面積337公頃，較上月190公頃增加77%；產量為6,157公噸，較上月產量3,341公噸，增產84%，與111年同期產量6,552公噸比較，則減產6%。

本月白花椰菜主要產區為彰化及高雄，預估收穫面積221公頃，較上月152公頃增加45%；產量為5,848

公噸，較上月產量4,022公噸，增產45%，與111年同期產量7,770公噸比較，則減產25%。係彰化產區受110年8月上旬西南氣流豪雨影響，有災後復耕集中種植情形；本年氣候平順，種植時間較為分散，預估收穫面積及產量較111年同期減少。

短期葉菜收穫面積605公頃，產量1萬1,977公噸，較上月減產4%。

短期葉菜（包含不結球白菜及薺菜）主要產區為雲林縣，次為新北、桃園及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜、青梗白菜（青江菜）及油菜等。本月為期作生產交替期，以生產不結球白菜為主。預估本月收穫面積605公頃，較上月624公頃減少3%；產量為1萬1,977公噸，較上月產量1萬2,427公噸，減產4%，與111年同期產量1萬1,481公噸比較，則增產4%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積498公頃，產量3,523公噸，較上月增產25%。

胡瓜屬連續採收型作物，依果形可分為大胡瓜和小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為裡作採收期，主要產區為屏東，次為彰化、雲林及高雄等地。雲林產區裡作胡瓜開始採收，整體產


量則較上月增加。預估本月收穫面積498公頃，產量為3,523公噸，較上月產量2,825公噸，增產25%，與111年同期產量3,794公噸比較，則減產7%。

絲瓜收穫面積632公頃，產量1,777公噸，較上月增產32%。

絲瓜生育期長可連續採收，且對環境適應性強。本月為期作生產交替期，主要產區為臺南、高雄及屏東，高雄產區10月種植之絲瓜開始採收，產量較上月增加。預估本月收穫面積632公頃，產量為1,777公噸，較上月產量1,345公噸，增產32%，與111年同期產量1,655公噸比較，則增產7%。

西瓜收穫面積68公頃，產量1,032公噸，較上月減產43%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充足的氣候。本月西瓜產區以臺南及高雄為主，其餘產區二期作西瓜採收期已結束，收穫面積及產量較上月減少。



預估本月收穫面積 68 公頃，較上月 118 公頃減少 42%；產量為 1,032 公噸，較上月產量 1,798 公噸，減產 43%，與 111 年同期產量 2,662 公噸比較，則減產 61%。係屏東產區裡作種植面積減少，預估收穫面積及產量較上年同期減少。

三、根莖類

青蔥收穫面積 432 公頃，產量 10,309 公噸，較上月增產 23%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥、粉蔥及大蔥。主要產區為宜蘭、臺中、彰化、雲林及高雄等地，適逢農曆年節需求，收穫面積及產量較上月增加。預估本月收穫面積 432 公頃，較上月 360 公頃增加 20%；產量為 1 萬 309 公噸，較上月產量 8,353 公噸，增產 23%，與 111 年同期產量 1 萬 722 公噸比較，則減產 4%。

裡作蘿蔔收穫面積 1,476 公頃，總產量 4 萬 9,128 公噸，較常年減產 19%。

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主要產區為彰化、雲林、嘉義及高雄等地。部分產區轉作硬質玉米，種植面積減少；或受病蟲害影響，單位產量減少。依據產地觀測，彰化、雲林及臺南等產區預估種植面積

較上年減少；高雄美濃地區白玉蘿蔔種植面積則與上年相當。預估本（111）年期裡作收穫面積 1,476 公頃，較常年同期 1,742 公頃減少 15%，與 111 年比較則減少 13%；產量為 4 萬 9,128 公噸，較常年同期 6 萬 630 公噸，減產 19%，與 111 年比較則減產 15%。



裡作大蒜收穫面積較上年期減少，較常年增加。

大蒜主要產地為雲林縣，占總產量九成以上，另臺南市、彰化縣及嘉義縣等地區亦有生產，目前各產區處於生育期。主產區前因 109 年及 110 年蒜價高漲影響，增加農民種植意願，使 111 年期種植面積大增，惟當年受天然災害影響，稍微影響農民 111 年期種植意願。經各基層公所現地勘查及巡迴觀測，112 年期種植面積較 111 年有減少之趨勢；較常年有增加之趨勢。產量部分，111 年受到充實不足及 3 月下旬降雨影響，112 年目前氣候平順，且偶有低溫，單位面積產量將回復正常年水準，但仍須需於採收期前辦理坪割以確定產量，總產量受到 112 年期面積減少之影響，仍較 111 年期為低。至與常年平均比較，則有增產之趨勢。

花卉類

菊花收穫面積 33.8 公頃，產量 1,117 萬枝，較上月產量增產 5%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗、溪湖等地。生長特性於日照時間漸短時行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9 月開花）、秋菊（10～11 月開花）及寒菊（12 月～翌年 1 月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。天氣轉涼，有利秋冬菊生長，預估本月收穫面積及產量略增；本年因疫情影響，產區有減少種植之現象。預估本月收穫面積為 33.8 公頃，較上月 32.3 公頃增加 5%，較 111 年同期 43 公頃減少 22%；本月產量預估為 1,117 萬枝，較上月 1,068 萬枝產量增產 5%，較 111 年同期 1,390 萬枝產量減產 20%。

洋桔梗收穫面積 9.55 公頃，產量 262 萬枝，較上月產量增加 23%。

洋桔梗適宜栽培溫度約為攝氏 15～25 度間，由於花型和花色豐富多樣，近年來廣為消費者所喜愛，主產區位於彰化縣永靖、田尾、北斗、嘉義新港及臺南麻豆等地。洋桔梗為冬季種植作物，本月進入生產期，預估本月收穫面積及產量增加。預估本

月可採收面積為 9.55 公頃，較上月 7.8 公頃增加 22%，較上年同期 11.52 公頃減少 17%；產量為 262 萬枝，較上月 212 萬枝增產 23%，較上年 321 萬枝減產 18%。

火鶴花收穫面積 141 公頃，產量 250 萬枝，較上月減產 5%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、六甲、佳里、高雄市內門、旗山、臺中市后里、南投縣埔里、屏東縣新埤等地。喜溫暖高濕度環境，可周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年 5～6 月及 9～10 月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。本月非火鶴花盛產期，氣溫漸低，早晚溫差大，評估本月產量略減。預估本月收穫面積 141 公頃，與上月面積相當，較 111 年同期 144 公頃減少 2%；產量 250 萬枝，較上月產量 263 萬枝減產 5%，較 111 年同期 273 萬枝減產 9%。

文心蘭收穫面積 254 公頃，產量 413 萬枝，較上月產量減產 1%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、北屯、石岡、雲林縣古坑、嘉義縣大林、屏東縣長治、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，切花具外銷優勢。栽培環境多為

網室栽培，每年5～6月及9～10月為盛產期。天氣漸轉涼，本月非文心蘭盛產期，評估本月產量略減。預估本月收穫面積254公頃，與上月面積相當，較111年240公頃同期增加6%；產量為413萬枝，較上月產量415萬枝減產1%，較111年同期產量429萬枝減產4%。

雜糧類

裡作紅豆收穫面積5,633公頃、產量1萬296公噸，較常年減產12%。

紅豆生產以秋裡作栽培主，產區集中在屏東、高雄等地區，其中又以屏東縣栽培面積最多。

依據產區觀測結果，因111年期減產，產地價格回穩，本年種植期間主產區並無重大災害，加以近年紅豆多供應作糕餅及冬季補品使用，市場需求穩定等因素，使農民種植意願略有回升。經主要產區辦理種植面積調查，預估112年裡作種植面積5,633公頃，較111年同期作5,084公頃，增加11%；若與常年同期作種植面積6,093公頃比較，則減少8%。產量部分，111年期受到110年10月上旬雨害及病蟲害影響，單位面積產量減幅明顯，本年期在111年10月上旬早植紅豆生育期間氣候條件不穩，導致果莢及種子偏小，10月中旬以後種植生育期間正常，單位面積產量恢復常年水準，預估總產量1萬296公噸，

較上年同期作產量8,220公噸比較，增產25%，若與常年同期作產量1萬1,718公噸比較，則減產12%。

裡作甘藷種植面積3,518公頃，較常年同期作增加3%。

國內裡作甘藷主要分布於中南部雲林、彰化及臺南等縣市，尤以雲林縣生產面積最大，臺南市次之。裡作甘藷之栽培多與一、二期水稻輪作，並配合稻作產期調整種植期間。近年甘藷種植面積受政府推動大糧倉計畫，推廣種植轉（契）作甘藷並設置集團產區，契作價格及種植面積穩定。除受相關政策影響外，主產區多與農民團體或農企業主體配合以契作方式生產，亦受其預估需求調整種植面積。至未參與契作之農戶，其種植意願隨種植品種品質及價格而有所調整。

依據主產區觀測結果，112年裡作契作面積尚稱穩定，其他個別農戶少部分轉作硬質玉米，預估112年裡作種植面積3,518公頃，較111年同期作種植面積3,563公頃比較，減少1%；若與常年同期作種植面積3,405公頃比較，則增加3%。

